



6036-14. MARCAPASOS DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA NO ISQUÉMICA

Rafaela Del Carmen Ramírez Rodríguez¹ y Antonia María Ramírez Rodríguez²

¹Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) y ²Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen

Introducción y objetivos: La TRC es una de las estrategias de tratamiento actuales para pacientes con IC y función sistólica reducida que, que ha demostrado producir un alivio significativo en los síntomas así como mejoría en la función ventricular izquierda y en la supervivencia. La miocardiopatía dilatada isquémica *versus* no isquémica se beneficia de la TRC pero no hay grandes estudios que analicen el tipo de dispositivo (MCP vs DAI resincronizador) a largo plazo. **Objetivo:** analizar las características basales de los pacientes sometidos a TRC. Evaluar los parámetros clínicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos antes y después de la TRC. Examinar la supervivencia a largo plazo.

Métodos: Cohorte retrospectiva de 407 pacientes sometidos a TRC desde 17 de mayo 2002 hasta 23 de junio 2020, media de $10,58 \pm 5,4$ años. Se estudiaron los parámetros clínicos, eléctricos y ecocardiográficos antes y después de la TRC. Con las curvas de Kaplan Meier se analizó la supervivencia.

Resultados: Se analizó 299 (73,5%) varones frente a 108 (26,5%) mujeres. La edad media de implante fue de $73,3 \pm 10,4$ años. Tenían cardiopatía isquémica 166 (40,8%) pacientes (p), fibrilación auricular 138 (33,9%), diabetes 147 (36,1%) p. Se implantó desfibrilador al 44,2% frente a 55,8% marcapasos. Hubo 155 (38,1%) ingresos fundamentalmente por IC 81 (19,9%). Hubo 215 (52,8%) fallecidos fundamentalmente por IC 86 (21,5%), infecciones 40 (9,8%) y neoplasias 22 (5,4%) principalmente. En la mujer hay un aumento de la supervivencia con el desfibrilador en los primeros 15 años pero después el marcapasos aumenta dicha supervivencia (*log rank* $p = 0,077$). En los no isquémicos hay mayor supervivencia aunque las curvas son muy superponibles hasta los 18 años (*log rank* $p = 0,455$).

Parámetros clínicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos antes y después de la TRC. N = 407

	Pre-TRC	Post-TRC	p
FE(%)	$30,2 \pm 8,2$	$39,1 \pm 12,3$	0,001
DTDVI (mm)	$67,0 \pm 9,1$	$10,3 \pm 12,1$	0,001

DTSVI (mm)	56,3 ± 10,1	50,3 ± 12,1	0,001
------------	-------------	-------------	-------

IM

0	44 (10,8%)	118 (29,1%)
---	------------	-------------

I	110 (27%)	142 (34,9%)
---	-----------	-------------

0,001

II	150 (36,9%)	99 (24,3%)
----	-------------	------------

III	81 (19,9%)	32 (7,9%)
-----	------------	-----------

IV	22 (5,4%)	16 (3,9%)
----	-----------	-----------

AI	45,6 ± 8,2	44,9 ± 9,7	0,001
----	------------	------------	-------

Clase funcional

I		118 (29%)
---	--	-----------


II	17 (42%)	142 (34,9%)	0,001
----	----------	-------------	-------

III	333 (81,8%)	99 (24,3%)
-----	-------------	------------

IV	52 (12,8%)	16 (3,9%)
----	------------	-----------

FE: fracción de eyección. DTDVI: diámetro telediastólico ventricular izquierdo. DTSVI: diámetro telesistólico ventricular izquierdo. IM: insuficiencia mitral. AI: aurícula izquierda.

Funciones de supervivencia



Curva de supervivencia dispositivo TRC y sexo.

Conclusiones: Existe mejoría de los parámetros clínicos, electrocardiográficos y ecoardiográficos tras la TRC. Las curvas de supervivencia son muy superponibles en cuanto a tener o no cardiopatía isquémica. El marcapasos resincronizador puede ser una alternativa a largo plazo en las mujeres.