



4017-8. EL PRONÓSTICO DEL IMPLANTE PERCUTÁNEO DE VÁLVULA AÓRTICA POR ACCESO TRANSAPICAL NO ES PEOR QUE EL TRANSFEMORAL SI EL RIESGO BASAL ES SIMILAR

Pablo Salinas, Ulises Ramírez-Valdiris, Raúl Moreno, Elkin González, Omar Razzo, Ignacio Plaza, José Luis López Sendón y José María Mesa del Hospital Universitario La Paz, Madrid y Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Resumen

Introducción: En la mayoría de series publicadas, el implante percutáneo de prótesis aórtica (IPVA) por acceso transapical (TA) conlleva una supervivencia inferior a la del acceso transfemoral (TF), si bien generalmente son poblaciones de mayor riesgo.

Métodos: Todos los pacientes consecutivos desde mayo de 2008 a los que se realizó un IPVA en nuestro centro se incluyeron en una base de datos dedicada y se siguieron prospectivamente al mes y al año (100% seguimiento). Se compararon las características basales y la supervivencia al año de ambos grupos.

Resultados: Se realizaron un total de 71 procedimientos (13 acceso TA y 58 acceso TF, todos ellos con prótesis Edwards-Sapiens). El riesgo estimado por EuroSCORE 1 y 2 fue similar (media de 17,4% TA vs 17,9% TF; $p = 0,70$ y 7,8% TA vs 6,7% TF, $p = 0,47$). Las características basales eran similares excepto que los pacientes de TA tenían más edad (85,3 TA vs 81,8 TF, $p = 0,04$, menor aclaramiento de creatinina (33,7 ml/min TA vs 52,5 ml/min TF, $p = 0,01$), y mayor frecuencia de infarto previo (40% TA vs 4,8% TF, $p = 0,01$) y enfermedad vascular periférica (38,5% TA vs 8% TF, $p = 0,01$). La tasa de éxito del procedimiento fue similar (92,3% TA vs 94,8% TF, $p = 0,72$), así como la mortalidad hospitalaria (15,4% vs 8,6%, $p = 0,46$). Los eventos hospitalarios fueron similares, únicamente hubo diferencias en la tasa de nueva aparición de fibrilación auricular (23,1% TA vs 3,45% TF, $p = 0,01$) y hemodiálisis (7,8% TA vs 0% TF, $p = 0,03$). En el seguimiento a un año (fig.), la supervivencia media fue de 10,3% para TA y 10% para TF (log rank $p = 0,84$). La supervivencia a 1 mes y a 1 año en el grupo TA fue del 92,3% y 84,6%; mientras que en el grupo TF fue del 94,8% y 81,4%.

Conclusiones: En una población con riesgo similar estimado por EuroSCORE, edad superior y peor función renal, el acceso transapical obtuvo un pronóstico al año similar al acceso transfemoral.

4017-8.tif