



4019-4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ANGIOGRÁFICAS Y HALLAZGOS EN TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA EN LA RESTENOSIS DEL *STENT* CON NEOATEROESCLEROSIS

Daniel Enríquez Vázquez¹, Carlos Salazar¹, M. José Pérez Vyzcaino¹, Carlos Nicolás Pérez García¹, Alejandro Travieso González¹, Pilar Jiménez Quevedo¹, Luis Nombela Franco¹, Iván Núñez¹, Pablo Salinas Sanguino¹, Hernán Mejía¹, Antonio Fernández Ortiz¹, Javier Escaned¹, Fernando Alfonso², Carlos Macaya¹ y Nieves Gonzalo¹, del ¹Hospital Clínico San Carlos, Madrid y ²Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Resumen

Introducción y objetivos: La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una técnica de imagen intracoronaria de alta resolución que permite la detección de neoateroesclerosis (NA) en la restenosis del *stent* (ISR). Los objetivos de este estudio fueron i) determinar las diferencias en la presentación clínica y angiográfica entre la ISR con y sin NA; y ii) evaluar las características por OCT de la ISR con NA.

Métodos: Se incluyeron casos de los ensayos RIBS IV y RIBS V (2 ensayos clínicos prospectivos, multicéntricos, controlados y aleatorizados que compararon balón liberador de fármaco frente a *stent* liberador de everolimus en pacientes con *stents* farmacoactivos (DES)-ISR (RIBS-IV) y *stents* sin recubrimiento (BMS)-ISR (RIBS-V)). Los ensayos incluyeron un subestudio de OCT de la restenosis. La NA se definió en la OCT como la presencia de tejido restenótico con calcificación (zona de baja reflectividad con bordes bien definidos) o contenido lípico (región de baja señal con bordes difusos).

Resultados: 64 pacientes fueron incluidos en el subestudio de OCT al inicio del estudio. En 23 pacientes (36%) la NA estaba presente en su tejido reestenótico. De esos, 7 (30%) fueron BMS y 16 (70%) fueron DES. En cuanto a las características basales no hubo diferencias en la edad, sexo o factores de riesgo. Los casos con NA se presentaron con más frecuencia con angina inestable 15 (65%) frente a 11 (27%) $p = 0,003$ y con más tiempo desde el implante del *stent* 1.117 (270-2.772) frente a 270 (200-1.075) días, $p = 0,01$. La proporción de DES en el grupo con NA fue mayor 16 (70%) frente a 21 (51%), no significativo (NS). La ISR con NA presentaron con mayor frecuencia un patrón angiográfico Mehran I 18 (78%) frente a 18 (44%) $p = 0,03$. Hubo una tendencia NS hacia más restenosis de borde en la NA, 7 (30%) frente a 7 (17%) $p = 0,22$. No hubo diferencias en otros parámetros angiográficos basales (diámetro mínimo del lumen, % de estenosis, longitud de la lesión, diámetro de referencia). Las diferencias en las características por OCT se encuentran reflejadas en la tabla. No hubo diferencias significativas en microvasos. No se observaron diferencias en mediciones de OCT de lumen y áreas de *stent*, expansión de *stent* y simetría.

Características por OCT

Característica	Neoateroesclerosis	Sin neoateroesclerosis	p
----------------	--------------------	------------------------	---

Patrón de capas	13 (57%)	8 (20%)	0,007
Baja reflectividad	14 (61%)	9 (22%)	0,002
Luz irregular	13 (64%)	8 (20%)	0,005
Material intraluminal visible	9 (41%)	7 (18%)	0,04
Macrófagos	21 (91%)	13 (33%)	0,001
Área baja intensidad <i>peristrut</i>	3 (13%)	23 (56%)	0,001
Carga de tejido reestenótico	33 ± 14%	40 ± 14%	0,08

Conclusiones: La ISR con NA tuvo una presentación clínica inestable con mayor frecuencia. Esto se correlacionó con la mayor frecuencia de hallazgos de OCT sugerentes de inestabilidad, como la presencia de material intraluminal, luz irregular y macrófagos.