



4010-3. DIFERENCIAS EN LA EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO ENTRE LOS TIPOS DE SÍNDROME AÓRTICO AGUDO TIPO B

Sergio Moral, Domenico Gruosso, Hug Cuellar, Valentina Galuppo, Giuliana Maldonado, Laura Gutiérrez, Gisela Teixidó y Arturo Evangelista del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.


Resumen

Introducción: Aunque las guías de práctica clínica recomiendan el mismo manejo terapéutico para los diferentes tipos de síndrome aórtico (SAA) tipo B, las diferencias en la evolución a largo plazo no están bien establecidas.

Objetivos: Comparar la morbilidad y mortalidad de los diferentes tipos de SAA tipo B a largo plazo.

Métodos: 152 pacientes con SAA tipo B fueron incluidos en un protocolo prospectivo de seguimiento clínico y mediante técnicas de imagen: disección aórtica (DA) 67(44%), hematoma intramural (HIM) 53 (35%) y HIM con disección localizada (DL) 32(21%) (fig. 1 A, B y C respectivamente). Se determinó la mortalidad aórtica y global, el tratamiento quirúrgico/endovascular, la isquemia visceral/periférica y el diámetro aórtico máximo (DMA) en un seguimiento medio de 58 ± 30 meses (rango 6-132 meses).

Resultados: Los pacientes con HIM tenían mayor edad que aquellos con DA (HIM con DL: $65,2 \pm 9,0$; HIM sin DL: $65,5 \pm 10,9$; DA: $55,5 \pm 12,5$ años; $p < 0,001$). El DMA basal fue similar en las tres entidades en la fase aguda ($p = 0,15$). Durante el seguimiento, la mortalidad global fue similar ($p = 0,34$), pero la DA presentó mayor mortalidad de causa aórtica que el HIM y la DL (15% vs 2% vs 0%; $p = 0,002$), mayor número de casos con isquemia visceral/periférica (8% vs 0% vs 3%; $p = 0,04$) y mayor crecimiento del DMA ($3,9 \pm 5,0$ vs $1,8 \pm 2,0$ vs $0,7 \pm 1,9$ mm/año; $p < 0,001$ respectivamente).



Conclusiones: En el SAA tipo B, la DA evoluciona a medio-largo plazo con más complicaciones aórticas que el HIM y la DL. En estos pacientes estaría indicado un manejo más agresivo en la fase subaguda del SAA. La DL presenta una dilatación progresiva del DMA mayor que el HIM que obliga a un seguimiento más próximo por técnicas de imagen.