



5011-5. SEGUIMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES TRATADOS MEDIANTE INTERVENCIONISMO CORONARIO DE UNA OCLUSIÓN CRÓNICA TOTAL. ANÁLISIS DE UNA SERIE DE 371 PACIENTES

Asier Subinas Elorriaga, José Ramón Rumoroso Cuevas, Mario Sádaba Sagredo, José Juan Onaindia Gandarias, Enrique García Cuenca, Xabier Arana Atxaga, Olga Quintana Raczka e Iñaki Lekuona Goya del Hospital de Galdakao, Vizcaya.

Resumen

Introducción y objetivos: La oclusión crónica total (OCT) es una de las últimas fronteras del intervencionismo coronario. Los resultados clínicos a largo plazo difieren de forma considerable entre diferentes estudios.

Métodos: Se realizó un análisis de 382 OCT verdaderas en un total de 371 pacientes, realizadas entre los años 2002 y 2015. Se analizó la revascularización de la lesión (RLD) y del vaso (RVD) diana, la restenosis binaria inducida por isquemia, la trombosis según criterios ARC y el MACE (revascularización de la lesión o el vaso diana, infarto de miocardio o muerte cardiovascular) entre los grupos revascularizados de forma exitosa (GE-OCT) y el grupo de fracaso (GF-OCT) en la revascularización. Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Mediana de edad de 62,9 años. Tasa global de éxito en la desoclusión del 79%. Mediana de seguimiento de 41,3 meses (RIQ 26,5-60,9). Tasa de seguimiento del 98,9%. No se realizó seguimiento angiográfico sistemático. La mortalidad intrahospitalaria fue del 0,52%. Tasa global de supervivencia del 92,3% en el GE-OCT y del 82,5% en el GF-OCT ($p = 0,04$). En el GE-OCT la tasa de RLD, RVD y restenosis binaria fue de 8,7%, 10% y 9,3% respectivamente. Tasa de trombosis definitiva del *stent* según los criterios ARC del 1,3% (5 casos). MACE total del 13,7% en GE-OCT frente a 23,8% en GF-OCT ($p = 0,028$) y mortalidad cardíaca del 2,7% (8 casos) en GE-OCT frente a 12,5% (10 casos) en el GF-OCT ($p = 0,001$).

Conclusiones: El tratamiento percutáneo de la OCT es seguro, con baja incidencia de eventos en el seguimiento clínico y tasas de revascularización aceptables. Objetivamos una reducción significativa de las tasa de mortalidad cardíaca y eventos cardiovasculares adversos en el grupo de pacientes revascularizados con éxito de una oclusión crónica total.