



6007-28. PARÁMETROS CLÍNICOS DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN UN HOSPITAL COMARCAL CON DIAGNÓSTICO DE SÍNCOPE

Rosario Izquierdo, Adrián Revello Bustos, José Luis Lozano, Jesús Marín Morgado, María Begoña Pérez Cano, Gabriel Retegui García de Quesada, Manuel Fernando González Vargas-Machuca y Mariano Ruiz Borrell del Hospital de San Juan de Dios, Bormujos (Sevilla).

Resumen

Introducción: El síncope es la manifestación de una gran variedad de situaciones, desde procesos banales hasta trastornos muy graves.

Objetivos: Definir los hallazgos clínicos de una población de pacientes atendidos en un hospital comarcal por síncope.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los datos clínicos de 360 pacientes asistidos consecutivamente en el área de Urgencias con el diagnóstico de síncope (enero 2009 a junio 2010).

Resultados: Se han estudiado 171 hombres y 189 mujeres, con una edad de $52,6 \pm 25$ años [rango = 2-96]. Solo en 24,4% de los pacientes existían antecedentes de neumo cardiopatía. Se identificaron como factores de riesgo vascular: ninguno (158 casos), tabaquismo (57), DM (60), HTA (138), obesidad (37) y dislipemia (59). El síncope tuvo un comienzo progresivo (181 casos) y en reposo (231 casos) más que súbito (81) o con el esfuerzo (29). Los síntomas fueron: cortejo neurovegetativo (204 casos), palpitaciones (16), dolor torácico (12) y disnea (5). Los días de ingreso fueron $0,3 \pm 1,6$ días [rango = 0-15]. Los diagnósticos finales fueron: síncope neuromediado = 247 (68,6%); hipotensión ortostática = 21 (5,8%); cardíaco = 13 (3,6%); otros = 79 (22%). No se produjo recurrencia en 309 pacientes (sí en 51) y la evolución clínica fue mayoritariamente favorable (344 casos).

Conclusiones: El perfil más frecuente de esta población fue: síncope de presentación progresiva y en reposo, de perfil neuromediado, con escasa necesidad de ingresos, baja tasa de recurrencias y buena evolución clínica.