


Revista Española de Cardiología




6012-16. EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD VALVULAR: COMPARACIÓN A LARGO PLAZO ENTRE PACIENTES AFECTADOS POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA Y MIOCARDIOPATÍA DILATADA

Rafaela del Carmen Ramírez Rodríguez, Alfonso Medina Fernández-Aceytuno, Antonia María Ramírez Rodríguez, Miguel Ángel García Bello, Antonio García Quintana, Eduardo Caballero Dorta, Marta Díaz Escofet y Maite León Sosa del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria y Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen

Objetivos: Analizar la efectividad de la terapia de resincronización Cardíaca en pacientes con enfermedad valvular comparándolo con la enfermedad isquémica y pacientes con miocardiopatía dilatada.

Material y métodos: Se realizó un seguimiento de 156 pacientes con TRC desde el 2003 hasta el 2011. Se incluyó pacientes con afectación orgánica del aparato valvular o implantación previa de prótesis valvular o reparación valvular. Los pacientes con enfermedad valvular tratados con TRC (n = 21) en comparación con la enfermedad isquémica (n = 87) y dilatada (n = 148) presentaron similar mejoría clínica y ecocardiográfica basal así como una similar mejoría en la fracción de eyección y similar reducción en los diámetros ventriculares en el seguimiento (49,7 meses) (tabla a pie de página).



Conclusiones: La TRC parece ser efectiva también en pacientes con enfermedad valvular. Sin embargo, en este grupo de pacientes el resultado a largo plazo después de la TRC no se superpone a ninguno de los otros dos grupos (ver curva de supervivencia).

