



Revista Española de Cardiología



4028-1. AUSENCIA DE EFECTO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA EN PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y FUNCIÓN SISTÓLICA PRESERVADA


Rafael Carlos Vidal Pérez, Emad Abu Assi, María Pazo Núñez, Carmen López Seijas, Francisco Lado Lado, Alfonso Varela Román, Vicente Lorenzo Zúñiga, José Ramón González-Juanatey, Servicios de Cardiología y Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.

Resumen

Antecedentes y objetivos: La Insuficiencia Cardiaca (IC) con Función Sistólica Preservada (FSP) es muy prevalente en ancianos, donde existe alto riesgo de complicaciones por polifarmacia. Se valoraron los efectos de fármacos comúnmente utilizados, sobre la supervivencia a largo plazo y hospitalizaciones en pacientes mayores de 75 años con IC y FSP.

Métodos: Inclusión prospectiva de pacientes (p) consecutivos mayores de 75 años ingresados desde enero de 2004 a diciembre 2005 en Medicina Interna con el diagnóstico de IC por criterios de Framingham y FSP por ecocardiografía. Se recogieron de la historia datos demográficos, comorbilidad y tratamiento farmacológico.

Resultados: Se estudiaron 146p, edad media $82,0 \pm 6$ años, 57,5 % mujeres; 65,8 % HTA; 31,1 % DM; 40,4 % miocardiopatía isquémica; 39,7 % primer episodio de IC; 26,0 % EPOC. Mediana de seguimiento 21 [7-46] meses. 93p (63,7 %) ingresaron por IC, 71 (48,6 %) fallecieron y 117 (80,1 %) murieron o fueron hospitalizados durante el seguimiento. No hubo beneficio con los diferentes tratamientos (tabla).



Conclusiones: Ningún de los diferentes tratamientos farmacológicos parece proporcionar un beneficio pronóstico a largo plazo en pacientes con IC y FSP mayores de 75 años.