



5018-7. DIFERENCIAS ENTRE PACIENTES CON MIOCARDIOPATÍA TÓXICA POSQUIMIOTERAPIA PRECOZ Y TARDÍA: CARACTERÍSTICAS Y PRONÓSTICO


Ulises López Cardoza¹, José González-Costello¹, Jesús Delgado Tres¹, Juan Fernando Carvajal Estupiñán¹, Sonia Pernas², Carles Díez López¹, Josep Roca Elías¹, Elena García Romero¹, Nicolás Manito Lorite¹ y Ángel Cequier Fillat¹, del ¹Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ²Institut Català d'Oncologia, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Resumen

Introducción y objetivos: La miocardiopatía tóxica (MT) después de recibir quimioterapia (QT) en pacientes con cáncer es un efecto secundario grave que puede ser clasificada, según su momento de aparición, en precoz o tardía. Existe poca evidencia sobre el impacto pronóstico que tiene el tipo de MT. Nuestro objetivo fue describir los pacientes según el tipo de MT y las diferencias en el pronóstico.

Métodos: Estudio observacional unicéntrico retrospectivo. Se incluyeron pacientes seguidos en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y que cumplían criterios diagnósticos de MT: 1) Una reducción de $\geq 10\%$ de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) post-QT con una FEVI final $\geq 50\%$ o reducción del 15% de la FEVI post-QT con FEVI final $> 50\%$. Se definió MT precoz si ocurrió ≤ 2 años post-QT y MT tardía si apareció > 2 años post-QT. Se analizó la mejoría en la FEVI mediante el test de Wilcoxon *signed rank* para muestras relacionadas y la supervivencia libre de trasplante cardíaco y libre de eventos cardiovasculares durante el seguimiento mediante curvas de Kaplan-Meier y análisis de regresión de Cox multivariado.

Resultados: De los 67 pacientes con MT: 46 presentaron cáncer de mama, 17 cáncer hematológico y 4 otros. 84% fueron tratados con antraciclinas y 45% con trastuzumab (TTZ). Edad mediana de 55 años y 25% en clase funcional 3-4. Encontramos 35 pacientes con MT precoz y 32 con MT tardía. Las diferencias significativas entre los 2 grupos en el momento de diagnóstico de MT fueron: mayor FEVI, mayor número de pacientes con TTZ, valores inferiores de péptido natriurético y menor grado de insuficiencia valvular mitral y tricuspídea en pacientes con MT precoz respecto a tardía. Tras inicio de tratamiento neurohormonal (92% bloqueadores beta, 93% IECA/ARA II, 41% antagonistas aldosterona) se evidenció una mejoría de la FEVI en ambos grupos: mediana de 45% a 58% ($p = 0,001$) en MT precoz y de 40% a 50% ($p = 0,001$) en MT tardía. Tras una mediana de 29 meses de seguimiento el grupo con MT precoz presentó mejor pronóstico (figura). Tras análisis multivariado, la presencia de MT precoz se asoció a mejor supervivencia libre de trasplante cardíaco: HR: 0,11 (IC95%: 0,02-0,62), $p = 0,012$.



Conclusiones: La mayoría de pacientes con MT secundaria a QT presentan una mejoría de la FEVI tras tratamiento neurohormonal. El pronóstico de los pacientes con MT precoz es mejor que aquellos con MT tardía.