



Revista Española de Cardiología



6058-442. MORTALIDAD POR INSUFICIENCIA CARDIACA EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA, EVOLUCIÓN 2007 A 2017

Juliana Caballero Güeto¹ y Francisco José Caballero Güeto²

¹Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. ²Hospital del SAS de Montilla (Córdoba) y Hospital Cruz Roja, Córdoba.

Resumen

Introducción y objetivos: En Andalucía, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en todas sus manifestaciones se encuentra entre las más altas de España. Describimos el patrón de evolución temporal de la tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca (IC) acontecido en nuestra comunidad y en España en los últimos años y las diferencias entre ambos.

Métodos: Datos de mortalidad por IC (tasa ajustada a la población europea/100.000) en Andalucía y España facilitados por el servidor interactivo de información epidemiológica Raziol del Instituto de Salud Carlos III. La población estándar europea es la propuesta por Eurostat en 2013, desde que se han incluido los datos de 2017, en ediciones anteriores se emplearon otras poblaciones estándar más antiguas.

Resultados: Andalucía 2007/2017: mujeres 40,53/25,09; varones 43,91/25,70. España 2007/2017: mujeres 25,79/15,81; varones 28,96/19,28. Diferencia absoluta tasas periodo 2007/2017: IC Andalucía: - 15,44 mujeres /-18,70 varones. España: - 9,98 mujeres /- 9,68 varones.

Tasas de mortalidad

	Tasa ajustada 2007	Tasa ajustada 2017	Diferencia absoluta periodo
España			
Mujeres	25,79	15,81	-9,98
Varones	28,96	19,28	-9,68
Andalucía			

Mujeres	40,53	25,09	-15,44
Varones	43,91	25,70	-18,70



Tasas de mortalidad por insuficiencia cardiaca 2017 y evolución temporal.

Conclusiones: El descenso absoluto en la tasa de mortalidad en el periodo estudiado es superior en Andalucía que la media de España para ambos sexos, y algo mayor en hombres en nuestra comunidad. La tasa de mortalidad ajustada continua siendo superior en Andalucía que la media nacional, pero las diferencias se han acortado un 40% en el periodo de estudio. Desde 2010 se objetiva una ralentización en el descenso de la tasa mortalidad en España, menos acusada en Andalucía. En nuestra comunidad, al final del periodo de estudio, la diferencia en la mortalidad entre ambos sexos es menor que en el resto del país.