



6006-4. VALORACIÓN DE LA RECURRENCIA Y RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO Y LA ANATOMÍA DEL FORAMEN OVAL PERMEABLE EN PACIENTES CON ICTUS CRIPTOGÉNICO


M. Teresa González Alujas, Laura Verónica Romero Grillo, Arantxa García Romero, Carlos Gutiérrez Landaluze, Laura Gutiérrez, Ana Laynez Carnicero, Arturo Evangelista Massip, David García-Dorado García, Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.

Resumen

Objetivos: Valorar los factores que influyen en la recurrencia del ictus (IC) en pacientes diagnosticados de foramen oval permeable (FOP).

Material y métodos: Se estudian 128 pacientes (70 mujeres, 46 ± 14 a.) diagnosticadas de IC y FOP. 94 (73 %) pacientes presentaban aneurisma del septo interauricular (ASI). Se analizaron las variables clínicas y ecocardiográficas, incluyendo la cuantificación de la severidad del cortocircuito, y el tratamiento establecido.

Resultados: Hubo 22 recurrencias en un seguimiento de $49,2 \pm 29,1$ meses. La recurrencia del IC en FOP moderado-severo y/o ASI fue 19 % (20/106) y en FOP ligero sin ASI del 9 % (2/22). No hubo recurrencias en pacientes anticoagulados o con cierre percutáneo.



Conclusiones: En los pacientes con FOP la recurrencia del IC afecta esencialmente a los pacientes con FOP moderado-severo y/o ASI. Una adecuada selección de los candidatos a anticoagulación y dispositivo puede reducir el número de recurrencias.