




4021-2. SUPERVIVENCIA EN LA HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA: ANÁLISIS DE DATOS DEL REGISTRO ESPAÑOL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (REHAP)

Leire Unzué Vallejo, Pilar Escribano Subias, Juan A. Barberá Mir, Antonio Román Broto, Javier Segovia Cubero, Javier Gaudó Navarro, María Lázaro Salvador, Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, Hospital Clínic, Barcelona y Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.

Resumen

Antecedentes y objetivos: La hipertensión pulmonar de origen tromboembólico (HPTE) es una de las formas de hipertensión pulmonar (HP) de mejor pronóstico, por la posibilidad de curación mediante cirugía (tromboendarterectomía pulmonar). El Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar (REHAP) es un registro voluntario de pacientes con HP evaluados entre enero/98 y abril/09 en 33 hospitales de España. El objetivo de nuestro estudio es analizar las características clínicas y supervivencia de los pacientes con HPTE respecto a los pacientes con HP idiopática (HPI) a partir de datos recogidos en el REHAP entre 1998 y el 2008. Se analizaron 452 pacientes (298 con HPI y 143 con HPTE) describiendo las características demográficas, clínicas y hemodinámicas en el momento de la inclusión. Se realizó comparación de medias mediante test de t Student para muestras independientes y análisis de supervivencia mediante curvas de Kaplan Meier.

Resultados: Ver tabla.



Conclusiones: Los pacientes con HPTE muestran edad más avanzada al diagnóstico, con mejores parámetros hemodinámicos pero peor situación funcional respecto a la HPI. La HPTE presenta tasas de supervivencia similares a las de la HPI, probablemente en relación con la baja proporción de pacientes con HPTE intervenidos quirúrgicamente (únicamente el 29 %).