



Revista Española de Cardiología



6001-657. TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN LA EDAD AVANZADA

Miguel Gómez Matarín, Rafael Nieto Leal, Natalia Bolívar Herrera, Juan José Macancela Quiñones, Alejandro Sánchez Espino, Soraya Muñoz Troyano, Rafael Ferrer López y Germán Merchán Ortega del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

Resumen

Introducción: En los ensayos de revascularización coronaria los pacientes de alto riesgo, incluidos los pacientes ancianos, obtienen un beneficio muy superior de la revascularización que aquellos de bajo riesgo. En la práctica clínica actual, al menos el 25% de todo el ICP realizado se lleva a cabo en pacientes mayores de 75 años. Nuestro objetivo es conocer el intervencionismo coronario realizado en personas de edad avanzada en nuestro entorno.

Métodos: Realizamos un estudio transversal retrospectivo en el que incluimos a todos los pacientes mayores de 75 años sometidos a cateterismo cardíaco, independientemente de su indicación, durante los años 2010 y 2011.

Resultados: Un total de 3.210 cateterismos fueron realizados en este periodo, de los cuales 787 (25%) se realizaron a mayores de 75 años. 509 (65%) fueron realizados a varones y 278 (35%) a mujeres. Con indicación de cardiopatía isquémica se realizaron 682 casos (87%), entre los cuales a 363 (53%) se realizó ACTP. Los motivos de no realización de ACTP en el 47% restante fueron coronariografía sin lesiones significativas, enfermedad difusa no revascularizable, lesión de vaso secundario e indicación de cirugía de revascularización. ACTP a un vaso fue realizada a 268 (74%), a dos vasos a 77 (21%) y a tres vasos a 418 (5%). Se realizó segunda ACTP por reestenosis de *stent* a 32 (8%). Se realizó ACTP urgente a un 2%. La muerte hospitalaria post-ACTP fue del 2%.

Conclusiones: La edad no es un factor limitante para el tratamiento intervencionista de la cardiopatía isquémica en nuestro medio. La indicación de cateterismo es mayor en hombres entre 75 y 80 años, a expensas de mayor prevalencia de cardiopatía isquémica en este rango de edad.