



6054-653. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES

Aintzane Telleria Echeveste¹, Idurre Vergara Gabilondo¹, Antonia Fonseca García², Iñaki Villanueva Benito¹, Itziar Solla Ruiz², Garazi Oria González², Eduardo Uribe-Echeverría Martínez¹ y Jaime Lucas Cabornero¹ del ¹O.S.I. Bidasoa, Hondarribia (Guipúzcoa) y ²Hospital Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Resumen

Introducción y objetivos: Los nuevos anticoagulantes orales han demostrado ser tan eficaces como los antagonistas de la vitamina K en la prevención de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular, con la teórica ventaja de ser más cómodos para el paciente por no precisar de controles periódicos. Sin embargo faltan estudios que evalúen el grado de satisfacción de los pacientes con dichos fármacos. Nuestro objetivo fue evaluar este aspecto.

Métodos: Se ofreció la cumplimentación de un cuestionario a todos los enfermos diagnosticados de fibrilación auricular y bajo tratamiento con los nuevos anticoagulantes que acudieron a cinco consultas de cardiología de dos hospitales de forma consecutiva entre 01/12/14 y 31/03/15. El cuestionario incluía la escala Duke de satisfacción con el tratamiento anticoagulante (DASS) que consta de 25 ítems. La puntuación de la escala oscila entre 25 y 175 puntos. A mayor puntuación en la escala mayor grado de insatisfacción con el tratamiento.

Resultados: Un total de 120 enfermos contestaron el cuestionario. Edad 72 ± 9 años, 64% varones, tiempo diagnóstico $4,9 \pm 5$ años, CHA₂DS₂-VASc: $3,2 \pm 1,4$, HAS-BLED $1,95 \pm 1$. El 36% tomaba dabigatran, el 47% rivaroxaban, y el 17% apixaban. La puntuación media de la escala DASS fue de $47,3 \pm 13,2$. No hubo diferencias en satisfacción en función del número de tomas al día de anticoagulante.

Conclusiones: El grado de satisfacción de los pacientes con el tratamiento con los nuevos anticoagulantes es alto, y superior al descrito en la literatura con los antagonistas de la vitamina K. No hay diferencias en la satisfacción de los pacientes en función del número de tomas al día del fármaco.