



6045-566. SIGNIFICADO PRONÓSTICO DEL HALLAZGO DE ATEROSCLEROSIS NO OBSTRUCTIVA EN LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE CORONARIAS


Alberto García Lledo¹, Susana Novo Aparicio¹, Virginia Ponz Mir¹, Azucena Sanz Barrio¹, Concepción Álvarez Sanz¹, Ana María Santiago Nocito² y Javier García-Pérez Velasco¹ del ¹Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid) y ²Universidad de Alcalá de Henares, (Madrid).

Resumen

Introducción y objetivos: El hallazgo de aterosclerosis coronaria no obstructiva es frecuente en pacientes a los que se realiza TAC multicorte por diversos motivos clínicos. El manejo de estos pacientes no está completamente aclarado desde el punto de vista de la prevención. El objetivo de este estudio es analizar el valor pronóstico de la aparición de aterosclerosis coronaria no obstructiva.

Métodos: Se ha analizado de forma retrospectiva una muestra de 582 pacientes a los que se hizo TAC de coronarias, el 87% por dolor torácico atípico para cardiopatía isquémica y el resto en pacientes sin angina. El riesgo medio de la muestra era moderado por *SCORE* (3,9) y Regicor (6.3).

Resultados: Se encontraron lesiones obstructivas en 189 pacientes (32,5%), no obstructivas en 107 (28,7%) y no había lesiones en 226 (38,8%). El seguimiento medio de los pacientes fue de 28 ± 3 meses. En ese tiempo hubo 11 eventos (muerte cardíaca, síndrome coronario agudo o revascularización no relacionada con los resultados de la TAC). No hubo ningún evento entre los pacientes con coronarias sin aterosclerosis. 4 pacientes con aterosclerosis no obstructiva y 7 con lesiones obstructivas sufrieron eventos (2,3% frente a 3,6%, ns).



Pacientes con eventos según el grado de obstrucción (%).

Conclusiones: El hallazgo de lesiones no obstructivas en la TAC multicorte supone un riesgo cardiovascular incrementado, no diferente en nuestra muestra del de quienes tienen lesiones obstructivas. Parece razonable intensificar la prevención en este tipo de pacientes.