



## 6004-84. INFLUENCIA DE LAS TERAPIAS APROPIADAS SOBRE EL PRONÓSTICO Y LOS EVENTOS CLÍNICOS EN PACIENTES PORTADORES DE DESFIBRILADOR

Diego Pérez Díez, Lucía Junquera Vega, José Manuel Rubín López, David Calvo Cuervo, Lidia Carballeira Pol, Fernando López Iglesias y César Morís de la Tassa del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

### Resumen

**Introducción y objetivos:** El DAI ha demostrado ser eficaz disminuyendo la mortalidad global a expensas de una reducción de la muerte súbita por arritmias ventriculares. Sin embargo, la presencia de terapias apropiadas se asocian a una mayor mortalidad generalmente debido a la progresión de la cardiopatía.

**Objetivos:** Evaluar las terapias apropiadas en nuestra cohorte de pacientes con cardiopatía isquémica y dilatada idiopática con primoimplante de DAI y su valor pronóstico.

**Métodos:** Realizamos un estudio observacional, retrospectivo, de seguimiento de 320 primoimplantes consecutivos de DAI entre 2008 y 2012.

**Resultados:** La edad media fue de 65 años (comprendida entre 30 y 83 años), 33 (10,3%) fueron mujeres. Factores de riesgo cardiovascular: HTA (55%), diabetes mellitus (30%), dislipemia (43%). Indicación de prevención 1ª (62%). Presentaban cardiopatía isquémica 266 pacientes (83%). Seguimiento medio de  $2,79 \pm 1,32$  años de 294 pacientes. Un 38% de pacientes presentaron terapias apropiadas y un 8% inapropiadas. 59 pacientes (18,4%) fallecieron en el seguimiento. Hubo más terapias apropiadas en varones (93,4% frente a 6,6%;  $p = 0,083$ ) y un mayor número de ingresos hospitalarios ( $p = 0,009$ ), pero no se observaron diferencias en cuanto a la mortalidad total ( $p = 0,81$ ).



*Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia de mortalidad (a) y de ingresos hospitalarios (b).*

**Conclusiones:** En nuestra serie de pacientes las terapias apropiadas se asociaron al sexo masculino y conllevaron más ingresos hospitalarios sin encontrarse diferencias en cuanto a mortalidad.