

Edad media (DE)	63,33 (13,24)	63,1 (13,13)	66,3 (14,19)	0,000	1,007	(1,000;1,013)	0,039
Sexo (varón) n (%)	7.918 (68,15)	7.496 (68,85)	422 (57,73)	0,000	0,657	(0,558;0,774)	0,000
Motivo de consulta (clínica típica) n (%)	8.623 (75,13)	8.126 (75,56)	497 (68,74)	0,000	0,805	(0,676;0,959)	0,015
Alertante (sanitario) n (%)	4.094 (36,05)	3.883 (36,47)	211 (29,68)	0,000	0,855	(0,720;1,016)	0,075
Antecedentes de CI (sí) n (%)	4.919 (42,34)	4.549 (41,78)	370 (50,62)	0,000	1,417	(1,21;1,658)	0,000
Portador de marcapasos (sí) n (%)	44 (0,38)	33 (0,3)	11 (1,51)	0,000	2,193	(0,938;5,126)	0,070
ECG con criterios claros (sí) n (%)	10.473 (92,07)	9.916 (92,96)	557 (78,67)	0,000	0,327	(0,266;0,401)	0,000
Killip inicial (Killip I) n (%)	10.460 (90,96)	9.851 (91,38)	609 (84,58)	0,000	0,644	(0,512;0,81)	0,000

CI: cardiopatía isquémica; ECG: electrocardiograma; OD: *odds ratio*; IC: intervalo de confianza.

Conclusiones: Se asociaron con errores en el diagnóstico prehospitalario ser mujer, una edad más avanzada, una presentación clínica atípica, antecedentes de cardiopatía isquémica, un ECG de difícil interpretación y un Killip inicial > 1.