



7. ACOPLAMIENTO VENTRÍCULO-ARTERIAL EN REPOSO COMO PREDICTOR DE HIPERTENSIÓN PULMONAR INDUCIDA POR EL EJERCICIO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA

Carmen Jiménez López-Guarch¹, Sergio Huertas Nieto², Irene Martín de Miguel², Fernando Sarnago Cebada², Maite Velázquez Martín¹, Nicolás Manuel Maneiro Melón², José Antonio García Robles², Teresa Segura de la Cal², Alejandro Cruz Utrilla², Jorge Solís Martín¹, Fernando Arribas Ynsaurriaga¹ y M. Pilar Escribano Subías¹

¹Cardiología. Hospital Universitario 12 de Octubre. CIBERCV, Madrid, España y ²Cardiología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Resumen

Introducción y objetivos: La enfermedad tromboembólica crónica (ETEC) se produce por oclusión vascular pulmonar trombótica crónica en ausencia de hipertensión pulmonar (HP) en reposo, con limitación al ejercicio por vasculopatía pulmonar establecida. El ecocardiograma en reposo tiene una utilidad limitada en el cribado y diagnóstico de esta entidad. El objetivo de este estudio es analizar nuevos predictores ecocardiográficos en reposo de la HP inducida por el ejercicio (HP-ej) en pacientes con sospecha de ETEC.

Métodos: Se incluyó a pacientes sintomáticos con defectos de perfusión en la gammagrafía pulmonar V/Q con terapia anticoagulante óptima durante al menos 3 meses después de un TEP agudo. Se descartó HP relevante en reposo (PAPm 25 mmHg, RVp 3 uW, PCPm 3 mmHg·L⁻¹·min⁻¹ se consideró una respuesta hemodinámica anormal al ejercicio. El acoplamiento ventriculoarterial (V-A) derecho se estimó como los ratios TAPSE/PAPs y *strain* longitudinal de la pared libre del VD (GLS-VD)/PAPs.

Resultados: Se incluyó 31 pacientes (32% mujeres, edad 51,8 ± 14,7 años). Catorce pacientes (45%) desarrollaron HP-Ej. Las características basales según la respuesta hemodinámica invasiva se muestran en la tabla. En la curva ROC, TAPSE/PAPs en reposo mostró un AUC 0,75 (IC95% 0,56-0,95) para predecir HP-ex. Un punto de corte de - 0,67%/mmHg, mostró una S 75,0%/E 87,5%, VPP 78,2% y VPN 82,4%. para predecir HP-ej.

Diferencias en relación con respuesta patológica al ejercicio

Respuesta hemodinámica

Todos (N = 31)	Anormal (N = 14)	Normal (N = 17)	p
----------------	------------------	-----------------	---

Años $\pm$ DE	51,8 $\pm$ 14,7	55,9 $\pm$ 17,9	48,5 $\pm$ 11,0	0,112
Sexo (mujeres) n, %	10 (32,3%)	5 (35,7%)	5 (29,4%)	0,709
Años desde EP media $\pm$ DE	3,9 $\pm$ 3,8	4,1 $\pm$ 3,6	3,8 $\pm$ 4,1	0,650
Diámetro basal VD mm $\pm$ DE	38,9 $\pm$ 4,8	39,1 $\pm$ 4,1	38,8 $\pm$ 5,4	0,821
Área diastólica VD cm/m ² $\pm$ DE	11,2 $\pm$ 2,6	11,1 $\pm$ 3,0	11,3 $\pm$ 2,3	0,813
TAPSE mm $\pm$ DE	20,9 $\pm$ 2,7	19,7 $\pm$ 2,5	21,9 $\pm$ 2,6	0,038
IT v. max m/s $\pm$ DE	2,6 $\pm$ 0,5	2,7 $\pm$ 0,4	2,5 $\pm$ 0,5	0,470
PAPs mmHg $\pm$ DE	32,7 $\pm$ 6,8	35,3 $\pm$ 7,2	30,6 $\pm$ 5,8	0,086
TAPSE/PAPs $\pm$ DE	0,67 $\pm$ 0,16	0,58 $\pm$ 0,15	0,73 $\pm$ 0,14	0,013
GLS -VD% $\pm$ DE	-23,9 $\pm$ 4,0	-21,9 $\pm$ 2,5	-25,4 $\pm$ 4,3	0,032
GLS-VD/PAPs %/mmHg	-0,74 $\pm$ 0,20	-0,62 $\pm$ 0,13	-0,84 $\pm$ 0,19	0,001
Tac-TSVD ms $\pm$ DE	104,2 $\pm$ 22,3	99,5 $\pm$ 23,4	107,3 $\pm$ 21,9	0,311
Índice de exc. diastólico VI media $\pm$ DE	1,01 $\pm$ 0,03	1,01 $\pm$ 0,05	1,0 (-)	1,000
Área AD cm ² $\pm$ DE	17,5 $\pm$ 4,6	17,8 $\pm$ 6,0	17,2 $\pm$ 3,0	0,926
PAPs invasiva mmHg $\pm$ DE	32,1 $\pm$ 9,2	37,2 $\pm$ 10,0	28,2 $\pm$ 6,6	0,007
PAPm invasiva mmHg $\pm$ DE	20,1 $\pm$ 5,5	22,7 $\pm$ 6,1	18,0 $\pm$ 3,9	0,017

DE: desviación estándar; IT: insuficiencia tricúspide; PAPs: presión arterial pulmonar sistólica; PAPm: presión arterial pulmonar media; GC: gasto cardiaco.

Conclusiones: La limitación del ejercicio parece atribuible a la HP-ej hasta en el 45% de los pacientes sintomáticos con trombosis pulmonar persistente tras un TEP sin HP relevante en reposo. Los parámetros

derivados del eco en reposo surrogados del desacoplamiento V-A, como TAPSE/PAPs y GLS-VD/PAPs, podrían ser de gran interés para identificar pacientes con respuesta hemodinámica anormal al ejercicio y ayudar en el diagnóstico inicial no invasivo de este creciente grupo de pacientes.