


Revista Española de Cardiología



6011-61. PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA SARCOIDOSIS CARDIACA

Santiago Fernández-Gordón Sánchez, Miguel Barranco Gutiérrez, Pablo Rojas Romero, Fernando Gavilán Domínguez y Antonio Aranda Dios

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Resumen

Introducción y objetivos: La afectación cardíaca en la sarcoidosis condiciona el pronóstico de la enfermedad. La presentación clínica es muy variada, por lo que su diagnóstico es un reto para los profesionales. Nuestro objetivo es conocer la presentación clínica inicial de la sarcoidosis cardíaca.

Métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con sarcoidosis cardíaca diagnosticados en nuestro centro entre el 2010 y el 2023.

Resultados: Se incluyeron 13 pacientes (69% varones) con edad media de 55 ± 9 años. La afectación cardíaca fue la forma de debut de la sarcoidosis en el 62% de los pacientes. Los síntomas más frecuentes fueron las palpitaciones (23%) y el síncope (23%), seguidos de la parada cardíaca (15%). La astenia, disnea y presíncope fueron infrecuentes como forma de presentación (8%). Dos pacientes fueron diagnosticados durante el cribado por sarcoidosis extracardíaca. Las principales manifestaciones cardiológicas fueron arritmias: taquicardia ventricular sostenida y fibrilación ventricular (46%) y bloqueos avanzados (39%). Tres pacientes presentaron insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.

Conclusiones: La sarcoidosis cardíaca es la primera manifestación de la sarcoidosis en la mayoría de los pacientes de nuestra población. En nuestra cohorte, los trastornos de la conducción y las arritmias ventriculares son las principales manifestaciones cardíacas. Es importante considerar este diagnóstico, más aún si nos encontramos ante un paciente joven.