

## Correcciones

**Corrección en el artículo de Kirchhof et al. «Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración con la EACTS». *Rev Esp Cardiol.* 2017;70:50.e1-e84**



***Correction in the Article by Kirchhof et al. "2016 ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation Developed in Collaboration With EACTS". *Rev Esp Cardiol.* 2017;70:50.e1-e84***

La Sociedad Europea de Cardiología comunica que se han realizado las siguientes correcciones en el artículo de Kirchhof et al. «2016 ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation Developed in Collaboration With EACTS». *Eur Heart J.* 2016;37:2893–2962, cuya traducción «Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración con la EACTS» se publicó en *Rev Esp Cardiol.* 2017;70:50.e1-e84.

Tabla 15, fila Esmolol, columna Control agudo de la frecuencia cardiaca vía intravenosa, donde pone 0,5 mg en bolo, debe poner 0,5 mg/kg en bolo.

Tabla 17, en las filas Dronedarona, Fleicanida y d,l-sotalol, columna Contraindicaciones principales y precauciones, las unidades de aclaramiento de creatinina aparecen como ml/dl y ml/ml, cuando lo correcto es ml/min.

Estas correcciones se han introducido en la versión electrónica del artículo el 8 de agosto de 2017.

---

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2016.11.014>

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2017.07.028>

0300-8932/