Desigualdades para las que no tenemos explicación, un fenómeno reproducible en distintas áreas poblacionales.**Respuesta*****Inequalities for Which We Have No Explanation, a Reproducible Phenomenon in Different Local Health Districts. Response*****Sra. Editora:**

Agradecemos los comentarios de Vidal-Pérez et al respecto a las desigualdades de sexo en el manejo de la fibrilación auricular, que permiten comprobar el verdadero grado de penetración de este problema en España^{1,2}. Estas desigualdades también están presentes en la atención urgente a otras enfermedades cardiovascular en nuestro país. Por ejemplo, un reciente estudio multicéntrico ha demostrado que, a pesar de que el tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda en urgencias es similar en varones y mujeres, estas ingresan menos en servicios de cardiología³.

Respecto a la atención del dolor torácico en urgencias, se constata que las mujeres de entre 71 y 80 años ingresan significativamente menos en cuidados intensivos/intermedios y para las de entre 81 y 90 años se solicita un porcentaje significativamente inferior de pruebas de esfuerzo⁴. En el caso del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, se ha objetivado que existe un mayor retraso en las mujeres en acudir al hospital, a la vez que el tiempo puerta-ECG también es significativamente mayor⁵. Creemos que estas sutiles diferencias que ponen de manifiesto todos estos estudios son difícilmente justificables con base en un diferente patrón de presentación de la enfermedad o necesidad de tratamiento en función del sexo.

Alba Riesgo^{a,b}, Òscar Miró^{b,c} y Blanca Coll-Vinent^{b,c,*}^aServicio de Urgencias, Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias, España^bGrupo de Investigación «Urgencias: procesos y patologías», IDIBAPS, Barcelona, España^cÁrea de Urgencias, Hospital Clínic, Barcelona, España

* Autor para correspondencia:

Correo electrónico: bcvinent@clinic.ub.es (B. Coll-Vinent).

On-line el 21 de junio de 2011

BIBLIOGRAFÍA

1. Vidal-Pérez R, Otero-Raviña F, Mazón Ramos P, González-Juanatey JR. Desigualdades para las que no tenemos explicación, un fenómeno reproducible en distintas áreas poblacionales. *Rev Esp Cardiol.* 2011;64:730.
2. Riesgo A, Sant E, Benito L, Hoyo J, Miró O, Mont L, et al. Diferencias de género en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular: análisis de base poblacional en un área básica de salud. *Rev Esp Cardiol.* 2011;64:233-6.
3. Riesgo A, Herrero P, Llorens P, Jacob J, Martín-Sánchez FJ, Bragulat E, et al., en nombre del grupo EAFHE. Influencia del sexo del paciente en la forma de presentación y en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda en los servicios de Urgencias españoles. *Med Clin (Barc).* 2010;134:671-7.
4. Riesgo A, Bragulat E, López-Barbeito B, Sánchez M, Miró O. Aproximación diagnóstica al dolor torácico en urgencias: ¿existen diferencias entre mujeres y hombres? *Emergencias.* 2008;20:399-404.
5. Carbajosa J, Llorens P, Diéguez S, Carratalá JM, Díaz J, Martínez E, et al. Influencia del sexo del paciente en el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST en los servicios de urgencias. *Emergencias.* 2011;23:87-92.

doi:10.1016/j.recesp.2011.04.007

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:

DOI: 10.1016/j.recesp.2011.03.028