



6033-14. EXPERIENCIA DE VIDA REAL CON PATIROMER. EFICACIA, SEGURIDAD Y UTILIDAD PARA OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA

Carolina Ortiz Cortés, Paloma Pérez Espejo, Benjamín Roque Rodríguez, Ana Isabel Fernández Chamorro, María Beltrán Moreno, Bernardo Lanza Reynolds, Miguel Ángel Silva Cerpa, José Javier Gómez Barrado, Gonzalo Marcos Gómez, María Victoria Mogollón Jiménez y Yolanda Porras Ramos

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Resumen

Introducción y objetivos: La hiperpotasemia es una alteración hidroelectrolítica frecuente en la insuficiencia cardiaca (IC), se asocia con mal pronóstico y puede limitar el uso de fármacos modificadores de la enfermedad. Recientemente se han desarrollado nuevas moléculas quelantes de potasio, como patiomer, que han demostrado ser efectivas y seguras reduciendo los niveles de potasio y que podrían ayudar a optimizar el tratamiento en pacientes con IC. El objetivo del presente trabajo fue describir la experiencia de uso práctico con patiomer en pacientes con IC.


Métodos: Estudio prospectivo y observacional en el que incluimos los primeros pacientes con insuficiencia cardiaca e hiperpotasemia (niveles de K $> 5,1$ mm/l) que iniciaron tratamiento con patiomer en nuestro centro. Se analizaron las características clínicas de los pacientes, eficacia y seguridad de patiomer así como tasas de mantenimiento de tratamiento inhibidor del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) al mes y a los 6 meses de tratamiento.

Resultados: Se incluyeron un total de 11 pacientes. La tabla recoge las características clínicas de los pacientes y la imagen 1 los datos de efectividad de patiomer. Se observó una reducción media de los niveles de potasio de 0,9 mm/l al mes que se mantuvo estable a los 6 meses (0,85 mm/l). Al mes, se consigue unas tasas de mantenimiento o subida de iSRAA superiores al 70-80% que a los 6 meses superan el 80-90%.(ARM-IECA/ARa/ARNI respectivamente).

Características clínicas, eficacia y seguridad de patiomer

n	11
Varones (%)	81,8
Edad (años)	74,6

DM (%)	82
FG medio (ml/min)	45
FEVI media (%)	31
Reducción K a 1m (mm/l)	0,9
Reducción K a 6m (mm/l)	0,85
%pac k 5,1 mm/l a 1 mes	76%
%pac k 5,1 mm/l a 6 mes	88%
Abandono tratamiento (n)	1
Efectos adversos	0



Tasas de iSRAA bajo tratamiento con patiromer.

Conclusiones: Nuestros primeros datos de uso de vida real de Patiromer sugieren que el fármaco es eficaz y efectivo en el control de la hiperpotasemia en los pacientes con IC. Estos buenos resultados podrían ayudarnos a mejorar la implementación de fármacos con beneficios pronósticos en la enfermedad. Será necesario evaluar estos datos en estudio de mayor tamaño.