



6054-8. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SIN LESIONES CORONARIAS OBSTRUCTIVAS EN ANCIANOS: ESTUDIO COMPARATIVO

Cristina Perela Álvarez¹, Alfonso Fraile Sanz², Daniel Nieto Ibáñez², Rocío Abad Romero², Renée Olsen Rodríguez², María Álvarez Bello², María Martín Muñoz², Bárbara Izquierdo Corone², David Galán Gil², María Jesús Espinosa Pascual², Rebeca Mata Caballero², Javier López Pais³, Paula Awamleh García², Carlos Moreno Vinués² y Joaquín J. Alonso Martín²


¹Hospital Universitario de Getafe (Madrid), ²Hospital Universitario de Getafe, Madrid y ³Complejo Hospitalario, Ourense.

Resumen

Introducción y objetivos: El infarto agudo de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas (MINOCA) está siendo ampliamente estudiado en la actualidad. Sin embargo, hay pocos datos acerca de los MINOCA en pacientes de edad avanzada. El objetivo del estudio es evaluar el perfil clínico, etiología y pronóstico de los pacientes diagnosticados de MINOCA en función de su edad.

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, observacional y analítico. La cohorte se escogió con todos los pacientes MINOCA consecutivos que ingresaron en nuestro hospital en un período de 6 años. Se emplearon las definiciones de la European Society of Cardiology 2020 y se analizaron más de 230 variables. Los pacientes se clasificaron en dos grupos de acuerdo a su edad: grupo 1: pacientes < 70 años; grupo 2: ≥ 70 años.

Resultados: Se incluyó a 81 pacientes en el estudio; 32 del grupo 1 y 49 del grupo 2. Atendiendo a características basales, los < 70 años tenían significativamente más factores de riesgo cardiovascular (FRCV) como hipertensión (90,6 vs 51%, p 0,01) y diabetes (37,5 vs 10,2%, p 0,01). Además, presentaban más comorbilidades como insuficiencia cardíaca (12,5 vs 0%, p = 0,02), fibrilación auricular (25 vs 6,1%, p = 0,01), EPOC (15,6 vs 2%, p = 0,03) y anemia (25 vs 6,3%). En contraposición, los pacientes ≥ 70 años presentaron más obstrucción coronaria no significativa (estenosis 30-50%), mientras que los < 70 años mostraron principalmente arterias coronarias lisas (estenosis < 30%). Los < 70 años sufrieron más infarto agudo de miocardio (IAM) tipo II (31,3 vs 8,3%, p 0,03); la mitad de ellas relacionadas con causas cardiovasculares. Las tasas de reingreso, IAM y accidente cerebrovascular fueron similares (tabla).



Conclusiones: Los pacientes ≥ 70 años presentan más comorbilidades y FRCV, lo que confiere mayor complejidad en el manejo del MINOCA. Respecto a su etiología, los < 70 años presentaron de forma más significativa IAM tipo II (probablemente como consecuencia de lo anterior) y menos vasoespasmo. En términos de pronóstico, los < 70 años presentaron mayores tasas de mortalidad.