



6000-239. INFLUENCIA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS AÓRTICA GRAVE MEDIANTE VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÁNEA

José María Segura Saint-Gerons, Francisco Mazuelos Bellido, Soledad Ojeda Pineda, Eduardo Caballero Dorta, Miguel Puentes Chiachío, Djordje Pavlovic Djurovic, Alfonso Medina Fernández-Aceytuno y José Suárez de Lezo Cruz-Conde del Servicio de Cardiología del Hospital Reina Sofía, Córdoba y Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen

Introducción: Analizamos la influencia de la fibrilación auricular en el tratamiento de la estenosis aórtica grave mediante TAVI.

Métodos: Entre abril de 2008 y diciembre de 2011, se intervino a 153 pacientes; 116 (76%) en ritmo sinusal (grupo I) vs 37 (24%) en fibrilación auricular permanente ($n = 28$) o paroxística ($n = 9$) (grupo II). El seguimiento fue 16 ± 12 meses para muerte, ictus y reingresos.

Resultados: La edad media fue 78 ± 5 años. No hubo diferencias basales (edad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, ictus, enfermedad pulmonar o renal) ni hemodinámicas (fracción de eyección, gradiente aórtico pico y área valvular aórtica) entre los grupos. El grupo II presentó mayor Euroscore logístico (21 ± 11 vs 15 ± 11 , $p = 0,05$) y presión sistólica pulmonar pico (51 ± 13 vs 43 ± 14 , $p = 0,05$). La técnica TAVI fue similar y eficaz en 105 pacientes (91%) del grupo I vs 32 (87%) del II (p : ns). Hubo 7 muertes (6%) intrahospitalarias en el grupo I vs 4 (11%) en el II (p : ns). Los pacientes en ritmo sinusal se trataron con aspirina y clopidogrel, y en fibrilación auricular con anticoagulación oral además de aspirina y/o clopidogrel. Durante el seguimiento, hubo 9 muertes (8%) en el grupo I y 4 (12%) en el II (p : ns). En el grupo I, hubo menos ictus (1% vs 11%, $p = 0,05$) y menos reingresos (4% vs 16%, $p = 0,05$). La supervivencia a los 2 años fue del 77% en el grupo I y 47% en el II ($p = 0,05$).

Conclusiones: Los pacientes con fibrilación auricular tratados con TAVI mostraron mayor incidencia de eventos, por lo que esta arritmia debería considerarse en la evaluación del riesgo.