



6039-513. PERICARDITIS AGUDA IDIOPÁTICA RECIDIVANTE. FACTORES PREDICTORES DE RESPUESTA A LA COLCHICINA

Silvia Rodero, Jaime Sagristá Sauleda, Ivo Roca Luque, Antonia Sambola Ayala y David García Dorado del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.

Resumen

La pericarditis aguda idiopática recidivante (PAIR) es una de las principales complicaciones de la pericarditis. La colchicina es una opción para prevenir las recidivas, pero los factores predictores de respuesta a este fármaco no son bien conocidos. El objetivo de nuestro trabajo consiste en describir los factores predictores de respuesta a la colchicina en la PAIR. Entre enero y diciembre de 2007 se incluyeron 30 enfermos consecutivos, con edad de 29 ± 16 años (16 a 71 años) e historia de PAIR. Habían presentado 5.8 ± 3 brotes (2 a 8 brotes), 16 habían tenido derrame pericárdico (DP) y 3 taponamiento cardíaco (TC). Recibieron colchicina durante 19 ± 16 meses (3 a 72 meses). Se compararon las características basales (edad, sexo, antigüedad de la enfermedad, DP, TC, media y duración de los brotes previos) entre los pacientes respondedores a colchicina y los que continuaban presentando brotes. Durante la administración de colchicina 16 pacientes quedaron asintomáticos. Se documentaron diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad (45,1 años en los respondedores a colchicina y 33,1 años en el resto, $p = 0,004$) y a la antigüedad de la enfermedad (42,4 meses en los respondedores a colchicina y 22,3 meses en el resto, $p = 0,003$). Las diferencias no fueron estadísticamente significativas en el resto de características estudiadas. Por lo tanto, coincidiendo con la administración de colchicina el 53% de los pacientes quedaron asintomáticos. Los únicos factores predictores de respuesta a la colchicina fueron una mayor edad y tiempo de evolución de la enfermedad. Estos factores podrían estar relacionados únicamente con la historia natural de la enfermedad.