



6047-594. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DETERMINADA CON ACELERÓMETROS, TRAS UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA POSINFARTO DE MIOCARDIO: ESTUDIO PROSPECTIVO

Ricardo José Jaimes Vivas, Carlos Gil Guillén, Arancha Ugarte Lopetegui, Nuria Castillo García y Guillermo Miranda Calderín del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Resumen

Objetivos: Determinar la evolución de la actividad física, mediante acelerómetros, en pacientes posinfarto tras un programa de rehabilitación cardiaca (PRC).

Métodos: Estudio prospectivo y observacional, realizado entre enero 2012-enero 2014. El acelerómetro (Body Media) se colocó en el brazo del paciente durante tres días, durante el PRC y al año. Se estudiaron el número de pasos, la duración de la actividad física > 3 METS (DAF > 3), el gasto energético > 3 METS (GE > 3), gasto energético total (GET) y METS promedio.

Resultados: Participaron 76 pacientes, 84,2% varones, con una edad media de $54,25 \pm 8,6$ años. La diferencia de pasos al año (11.460, DE: 5.995) frente a los pasos durante el PRC (10.344, DE: 5.274) no fue significativa (p 0,129). Sin embargo la DAF > 3 (91,10 frente a 117,75 minutos) mostró una p 0,017, la diferencia en el GE > 3 (486,34 frente a 623,5 calorías) una p 0,021. La diferencia en el GET (2.373,34 frente a 2.564,34 calorías) obtuvo una p 0,001. En el análisis por subgrupos, los hombres realizan un mayor número de pasos que las mujeres (10.834 frente a 7.734 p 0,06). No encontramos relación entre el nivel de riesgo, FEVI, número de vasos afectados y los pasos caminados. La correlación de Pearson (r 0,61) entre el número de pasos y los METS de la ergometría fue significativa (p 0,01).

Conclusiones: Los pacientes mejoran al año los datos de actividad física. Los hombres caminan más que las mujeres. Existe una correlación directa entre el número de pasos y los METS de la ergometría.