



Revista Española de Cardiología



6015-10. EL STENT RECUBIERTO DE EVEROLIMUS PUEDE TENER UN BENEFICIO EN EL REMODELADO DEL VASO EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS MÁS ALLÁ DEL SEGMENTO STENTADO (TITANIC XV)


Luis Javier Doncel Vecino, J. Ramón López Mínguez, Juan Manuel Nogales Asensio, Francisco Pomar Domingo, Pedro Martínez Romero, José Antonio Fernández Díaz, José Francisco Díaz Fernández, Pasi Karjalainen, Complejo Universitario Infanta Cristina, Badajoz, Consorcio Hospital General Universitario, Valencia y Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

Resumen

Antecedentes y objetivos: El TITANIC XV trial es un estudio multicéntrico, aleatorizado en pacientes (p) diabéticos (DM) con lesiones de riesgo intermedio para reestenosis (vasos entre 2,5-3,5 mm y con lesiones < 28 mm) revascularizados con el stent bioactivo de titanio (T) vs el de everolimus (E).

Métodos: Los 173 p con edad media de $65,5 \pm 9,5$ años y un seguimiento medio de $510,3 \pm 228,9$ días estaban bien equilibrados en las variables demográficas y angiográficas. Se trataron $1,6 \pm 0,8$ lesiones y $1,7 \pm 0,9$ stents/p en ambos grupos. El diámetro medio era $3,0 \pm 0,4$ mm y la longitud máxima $19,3 \pm 7,9$ mm.

Resultados: Los eventos se muestran en la tabla.



Conclusiones: En el grupo T casi la mitad de las revascularizaciones se debían a ICP en el mismo vaso más allá de la lesión diana, mientras que esto no era así en el grupo E. Este dato sugiere un efecto beneficioso del stent de E en el remodelado de segmentos diferentes al stentado en los pacientes diabéticos.