



## 6020-5. PREVALENCIA Y PREDICTORES DE ISQUEMIA EN LOS PACIENTES CON REVASCULARIZACIÓN CORONARIA CON STENTS

David Alonso Rodríguez, Julia M.<sup>a</sup> Martín Fernández, Alejandro Vega Primo, Sara Álvarez Castañera, Ignacio Iglesias Gárriz, Felipe Fernández Vázquez, Miguel A. Rodríguez García, Complejo Asistencial de León, León y Centro de Salud La Palomera.

### Resumen

**Antecedentes y objetivos:** La presencia de isquemia en los pacientes con enfermedad coronaria es un importante marcador pronóstico. Analizar la prevalencia y los predictores de isquemia en los pacientes revascularizados de forma percutánea con stents (ICP-S)

**Métodos:** Incluimos de forma retrospectiva 1170 pacientes que fueron remitidos de forma consecutiva al ecocardiograma de estrés con ejercicio (Eco-S) después de ICP-S. Los pacientes fueron divididos en dos grupos, unos con un ecocardiograma de estrés positivo (ESP) y otros con resultados negativos (ESN).

**Resultados:** La isquemia miocárdica (IM) se observó en 190 pacientes (16,2 %). Los factores asociados a IM en el análisis univariado fueron la diabetes mellitus (DM), la revascularización incompleta (RI) y las anomalías basales de la contractilidad. En un modelo multivariante de regresión logística la DM (OR 6,0 IC: 2,2-17,1), RI (OR 4,0 IC: 2,2-7,4) y la disfunción ventricular izquierda (OR 0,94 IC 0,89-0,98) se asociaron de forma independiente a la presencia de IM. La historia previa de reestenosis del stent (6,3 % vs 10,1 % en ESN y ESP, respectivamente;  $p = 0,339$ ), el número total de stents empleados ( $2,1 \pm 1,3$  vs  $2,0 \pm 1,3$ ;  $p = 0,458$ ) y el tipo de stent usado (67,7 % de stents no recubiertos en ESN vs 60,5 % en ESP;  $p = 0,248$ ) no fueron predictores de IM.

**Conclusiones:** La presencia de isquemia detectada en el ecocardiograma de estrés ejercicio es frecuente en los pacientes tras la revascularización coronaria con stent. Existen 3 factores (DM, RI y disfunción ventricular izquierda) que se asocian de forma independiente a la detección de isquemia en esta población de pacientes.