



4041-11. DIFERENCIAS ANATÓMICAS Y FUNCIONALES DEL FORAMEN OVAL PERMEABLE COMO HALLAZGO INCIDENTAL VERSUS EL DE PACIENTES CON ICTUS CRIPTOGÉNICO


Noelia Castro Bueno, José Ramón Ortega Trujillo, Pedro Martín Lorenzo, Juan Morales González, Verónica Quevedo Nelson, Haridian Mendoza Lemes, José María Nóvoa Medina, Alfonso Medina Fernández-Aceytuno, Hospital Universitario Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Resumen

Antecedentes y objetivos: La prevalencia de FOP en la población general es elevada, aunque existe poca información acerca de su anatomía cuando se compara con el FOP asociado a ictus criptogénico. Nuestro objetivo es comparar el FOP en ambas poblaciones.

Métodos: En 280 estudios ecocardiográficos transesofágicos (ETE) consecutivos (excluyendo pacientes con ictus criptogénico) se identificó la presencia de FOP en 43 (15 %, grupo I). Los rasgos anatómicos y funcionales de dichos FOP se compararon con los de 80 pacientes con FOP e ictus criptogénico (grupo II).

Resultados: Se resumen en la tabla.



Conclusiones: En FOP como hallazgo casual tiene un menor tamaño y presenta rasgos anatómicos diferentes al asociado a ictus criptogénico.