



6008-151. TEST DE DETECCIÓN DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA: ¿A QUÉ TIPO DE PACIENTES SOLICITAMOS CADA HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA Y QUÉ GARANTÍA OFRECEN?

Pablo Flórez Llano, Alberto Alperi García, Iria Silva Conde, Amaia Martínez León, Vicente Barriales Álvarez, Alba María Martín Acuña, Jesús M. de la Hera Galarza y César Morís de la Tassa del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

Resumen

Introducción y objetivos: Las pruebas de detección de isquemia (TDI) miocárdica eco-estrés (EE) y el test isotópico con tomografía computarizada de emisión monofotónica con tecnecio 99 (SPECT) son los más usados para diagnóstico y estratificación de riesgo coronario. El objetivo del estudio fue analizar las diferencias en características basales y de enfermedad cardiovascular a los que se solicita una u otra prueba y la supervivencia libre de eventos coronarios que confiere un test negativo.

Métodos: Estudio prospectivo, que incluye 867 pacientes consecutivos (2014-2016) con TDI miocárdico realizado en un centro de tercer nivel. Comparamos entre grupos EE (n = 525) y SPECT (n = 342) en cuanto a características y motivo de petición. Analizamos la supervivencia libre de síndrome coronario (SCA) o muerte cardiovascular en los pacientes sin isquemia inducible.

Resultados: 867 pacientes incluidos. Edad media $63,6 \pm 10,8$ años y 62,2% varones. 525 (60,56%) grupo EE y 342 (39,44%) grupo SPECT. El grupo sometido a EE era de mayor edad (65,2 frente a 62,4 años, $p = 0,001$), con mayor porcentaje de varones (65,9 frente a 55,4%, $p = 0,02$), de fumadores (17,8 frente a 11,2%, $p = 0,007$), de pacientes con enfermedad renal crónica al menos estadio III (4,6 frente a 2,3%, $p = 0,04$) y de cardiopatía isquémica previa (42,3 frente a 33,6%, $p = 0,005$). En el grupo SPECT fue más frecuente el antecedente de hipertensión (69,6 frente a 60,1%, $p = 0,005$) y de enfermedad arterial periférica (12,2 frente a 5,9%, $p = 0,02$). No existieron diferencias entre EE y SPECT en cuanto a diabetes (24,8 frente a 26,9%, $p = 0,4$), dislipemia (48,8 frente a 51,6%, $p = 0,18$) ni ictus o AIT previo (6,8 frente a 9%, $p = 0,08$). El motivo de petición más frecuente en pacientes sometidos a EE fue angina típica, seguido de dolor torácico (DT) atípico y de evaluación de lesiones residuales tras SCA. Mientras que en el grupo SPECT el motivo más frecuente fue DT atípico (tabla). En el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier tras prueba de TDI negativa, más del 90% de pacientes permanecían libres de eventos a los 2,5 años de seguimiento con ambas técnicas (figura).



Supervivencia libre de evento si TDI negativo.

Motivos de petición de TDI

Motivo de petición	Eco-estrés	SPECT-Tc99
Ángor estable	143 (27,5%)	126 (36,9%)
Ángor inestable	32 (6,1%)	10 (2,9%)
IAM no Q	2 (0,4%)	1 (0,3%)
Post-IAM (lesiones residuales)	75 (14,4%)	33 (9,7%)
Dolor torácico atípico	140 (26,9%)	120 (35,1%)
Disnea	62 (11,9%)	31 (9,1%)
Otros	54 (10,4%)	21 (6,1%)
Valvulopatía	12 (2,3%)	0

Comparación de los motivos de petición en ambas pruebas de TDI analizadas. Valor numérico expresa número total de pruebas por cada motivo de petición.

Conclusiones: El TDI miocárdica mediante EE se solicita a un perfil de pacientes con más riesgo cardiovascular y más enfermedad coronaria establecida que el SPECT. El análisis de supervivencia muestra una buena fiabilidad de ambas técnicas a medio plazo cuando el resultado es negativo.