



6038-519. SÍNDROME DE *TAKO-TSUBO* RECURRENTE ¿SON PACIENTES DIFERENTES?

Iván Javier Núñez Gil, Alberto Duran-Cambra, Manuel Almendro Delia, Óscar Vedia, Mireia Andrés, José Tomás Ortiz, Alberto Pérez Castellanos, José Antonio Linares Vicente, Óscar Fabregat, Irene Martín, Alejandro Sánchez-Grande-Flecha y Juan Manuel Escudier-Villa; investigadores del estudio RETAKO.

Resumen

Introducción y objetivos: El síndrome de *tako-tsubo* (STK) generalmente se presenta clínicamente como un síndrome coronario agudo, sin lesiones coronarias relevantes responsable. A pesar de relacionarse con un buen pronóstico, ocasionalmente se han visto recurrencias. Nuestro objetivo fue valorar las características clínicas de los pacientes con recurrencias incluidos en el registro multicéntrico RETAKO.

Métodos: Analizamos los enfermos incluidos en nuestra base de datos con recurrencias comprobadas dentro de los enfermos recogidos en el registro, sobre un total de 456 pacientes. Con un seguimiento mediano de 5,2 meses pudimos identificar 7 pacientes con, al menos, un episodio de recurrencia de STK confirmada mediante coronariografía y criterios diagnósticos de Mayo.

Resultados: Todos los pacientes recurrentes fueron mujeres, con frecuentes factores de riesgo cardiovascular y obesidad. No hubo diferencias en cuanto a collagenopatías, nefro-hepatopatías o enfermedades neurológicas respecto a los STK de primer episodio. Todos los STK recurrentes fueron formas primarias, principalmente con desencadenante psíquico y dolor torácico como síntoma principal. No hubo diferencias en el seguimiento en cuanto a complicaciones comparados con los STK de primer episodio.

Desglose de pacientes con STK recurrente

Caso	Edad	Factores de riesgo cardiovascular	Episodio <i>tako-tsubo</i> previo	Desencadenante (actual)
1	77	Hipertensión, obesidad	2007/2012	Problema familiar
2	62	-	2008/2014	Discusión familiar
3	82	Hipertensión, diabetes, fumador, obesidad	2005/2008	Pelea con marido

4	64	Hipertensión, dislipemia, fumador	2009/2012	Discusión familiar
5	75	Hipertensión	2011/2012	Ansiedad. Hijo desempleado.
6	75	Dislipemia.	2007/2010/2013	-
7	64	Hipertensión, obesidad	2000/2013	-

Conclusiones: El síndrome de *tako-tsubo* recurrente suele afectar a mujeres obesas y con múltiples factores de riesgo cardiovascular. STK de carácter primario, habitualmente acaecen tras un nuevo episodio estresante.