



6008-35. ORIGEN DEL FLUTTER AURICULAR Y EFICACIA DE LA ABLACIÓN EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA


Nuria Rivas Gándara, Ángel Moya i Mitjans, Jaume Casaldàliga Ferrer, Jordi Pérez Rodón, Iván Roca Luque, M.^a Antonia Pijuan Doménech, Laura Dos Subirá, David García-Dorado García, Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.

Resumen

Antecedentes y objetivos: El flutter auricular (FA) en pacientes (pts) con cardiopatía congénita (CC) puede presentarse como FA típico istmo-dependiente (FAID) o cicatricial (FAC). El objetivo del estudio es evaluar el origen del FA y la eficacia de la ablación (RF) en una serie de pts con CC.

Métodos: Análisis retrospectivo de todas las RFs de FA en pts con CC realizadas en nuestro centro en los últimos 10 años.

Resultados: Se analizaron un total de 37 FA en 34 RFs realizadas a 27 pts (8 mujeres, edad media $36,4 \pm 18$ años). Los tipos de FA diagnosticados fueron 21 FAC, 15 FAID y 1 desconocido. El análisis en función del tipo de CC (tabla) mostró una mayor frecuencia de FAC en pts con cirugía tipo Mustard ($p = ns$). La eficacia de la RF fue del 52,4 % en el FAC vs 93,3 % en el FAID ($p = 0,009$).



Conclusiones: En nuestra serie de pts con CC sometidos a ablación de FA el FAC fue más frecuente. La eficacia de la RF del FAC fue significativamente más baja que la del FAID.