



4024-4. FACTORES PREDICTORES DE MORTALIDAD EN LA TROMBOSIS DE STENTS


Leire Unzué Vallejo, Felipe Hernández Hernández, Julio García Tejada, Maite Velázquez Martín, Agustín Albarrán González-Trevilla, Javier Andreu Dussac, Adolfo Fontenla Cerezuela y Juan Tascón Pérez del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Resumen

Introducción y objetivos: La trombosis de *stent* (TS) es una de las complicaciones más temidas tras la intervención coronaria percutánea, por su mala evolución clínica y elevada mortalidad. Existen múltiples estudios dirigidos a identificar los factores predictores de la TS, sin embargo; muy pocos analizan los factores que pueden predecir mayor mortalidad del cuadro de trombosis. El objetivo de nuestro estudio es analizar los factores predictores de mortalidad de TS en una serie de pacientes.

Métodos: Análisis retrospectivo de las TS definitivas remitidas a un centro en 3 años consecutivos, con descripción de características clínicas, angiográficas y manejo terapéutico en el procedimiento inicial del implante y en el cuadro de TS. Análisis estadístico de regresión lineal múltiple para estudiar la relación entre variables (SPSS 14.0).

Resultados: 2028 pacientes fueron tratados con 3.004 *stents*. Se detectaron 45 casos de TS definitiva. La mortalidad del cuadro de TS en nuestra serie fue del 17,8%. La diabetes mellitus fue el único factor de riesgo clínico predictor de mortalidad. El infarto agudo de miocardio en el procedimiento del implante del *stent* y la localización en descendente anterior o injerto de vena safena se asociaron con una mayor mortalidad. En los *stents* implantados en injertos de vena safena, la incidencia de trombosis fue del 9% durante el periodo de estudio. La TS precoz (aguda y subaguda) se asoció a una mortalidad significativamente mayor, en comparación con la TS tardía y muy tardía. En nuestra serie el implante de un segundo *stent* no se asoció a una mayor mortalidad.



Conclusiones: La TS es un cuadro con una mortalidad elevada. La determinación de factores predictores de mortalidad en la TS puede ayudar a identificar a los pacientes con peor evolución clínica inmediata, que se beneficiarían de un tratamiento precoz intensivo.

4024-4.tif

Predictores de mortalidad detectados. A y B: trombosis aguda por placa culpable en el borde del *stent*. C: trombosis de *stent* en descendente anterior. D: trombosis de *stent* en injerto de vena safena.