



6000-263. VALOR PRONÓSTICO DE LA TROPONINA-T EN LA PERICARDITIS AGUDA


Sergio Gamaza Chulián, Javier León Jiménez, María Recuerda Núñez, Santiago Jesús Camacho Freire, Alejandro Gutiérrez Barrios y José Carlos Vargas-Machuca Caballero del Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resumen

Introducción y objetivos: La troponina cardíaca T (Tp-T) ha mostrado su valor pronóstico en enfermedades cardiovasculares, si bien existen pocos estudios que valoren su utilidad en la pericarditis aguda. Nuestro objetivo fue investigar el valor clínico y pronóstico de estos marcadores en la pericarditis aguda de origen vírico o idiopático.

Métodos: Se incluyeron 107 pacientes que ingresaron en nuestro hospital por pericarditis aguda entre enero de 2001 y septiembre de 2011, excluyéndose las pericarditis postinfarto. Se dividieron a los pacientes en función de su cifra de Tp-T en pericarditis (Tp-T $\leq$ 0,1 ng/ml) y miopericarditis (Tp-T $>$ 0,1 ng/ml).

Resultados: Entre los 107 pacientes (94% varones) con edad mediana 33 años (desde 14 a 83 años), hubo 65 miopericarditis y 42 pericarditis. En el análisis multivariante sólo la edad se relacionó inversamente con la elevación de Tp-T ($p = 0,02$). Durante un seguimiento medio de 50 meses, se encontró un índice de complicaciones similar en ambos grupos: pericarditis recidivante (19% vs 11%, $p = 0,23$), taponamiento (5% vs 2%, $p = 0,56$). Sólo se registró un caso de muerte hospitalaria en el grupo de miopericarditis (0% vs 2%, $p = 0,62$), sin casos de pericarditis constrictiva ni disfunción ventricular residual. Tampoco hubo diferencias significativas en la mortalidad de ambos grupos en el seguimiento (9% vs 2%, $p = 0,20$).



Conclusiones: En la pericarditis aguda, la elevación de Tp-T es un hallazgo común, y se asocia más comúnmente a edad joven. Sin embargo, a diferencia del síndrome coronario agudo, la Tp-T en la pericarditis aguda no constituye un factor pronóstico adverso.