



6017-11. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DESDE LA PERSPECTIVA DEL SEXO EN UNA CONSULTA DE CARDIOONCOLOGÍA

Josué López Baizán, Fátima Esteban Martínez, Daniel Pastor Wulf, Ignacio Gallo Fernández, Gloria María Heredia Campos, Adriana Resúa Collazo, Consuelo Fernández-Avilés Irache, Mónica Delgado Ortega, Ana Rodríguez Almodóvar, Dolores Mesa Rubio y Martín Ruiz Ortiz

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Resumen

Introducción y objetivos: La enfermedad cardiovascular y las neoplasias son las principales causas de muerte y discapacidad en ambos sexos. Ambas entidades están conectadas por mecanismos fisiopatológicos y comparten factores de riesgo que ensombrecen el pronóstico durante el tratamiento antitumoral. El objetivo del estudio es describir la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) modificables en una consulta de cardioncología, y analizar su distribución en función del sexo.

Métodos: Se recogió la prevalencia de FRCV de los pacientes atendidos, y se analizaron en función del sexo mediante el test de chi cuadrado.

Resultados: Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020 se valoraron 293 pacientes en la consulta de cardioncología, un 65% (191) mujeres con una edad media de 59 ± 14 años. De forma global, un 25% (75) tenían antecedentes de tabaquismo activo, un 30% (89) eran hipertensos, 14% (41) diabéticos, 19% (55) dislipémicos y un 15% (45) presentaban obesidad. La mayoría tenía un solo FRCV registrado 84 (29%), 54 pacientes dos (18%), 22 tenían tres (7,5%), y 9 (3,1%) cuatro o más FRCV. Se observó una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al consumo de tabaco y presencia de dislipemia, siendo mayor en varones. La presencia de algún FRCV así como de múltiples FRCV (4 o más) fue más común en varones.

Prevalencia del número de factores de riesgo por sexo

	Varones (n = 102)	Mujeres (n = 191)	p
Ningún factor	25 (24%)	99 (52%)	p = 0,0001
Un FRCV	41 (40%)	43 (22,5%)	p = 0,001
Dos FRCV	21 (20%)	33 (17%)	p = 0,4

Tres FRCV	8 (8%)	14 (7%)	p = 0,8
Cuatro o más FRCV	7 (7%)	2 (1%)	p = 0,006



*Distribución porcentual según el número de factores de riesgo presentes y según sexo. *p 0,01.*

Conclusiones: La prevalencia de FRCV en la consulta de cardioncología fueron elevados y ligeramente superior en varones, resultados concordantes con la literatura. Las consultas de cardioncología son una herramienta fundamental en el diagnóstico, control y tratamiento de los FRCV.