Rev Esp Cardiol. 2023;76(Supl 1): 542

Revista Española de Cardiología

3. TRASPLANTE CARDIACO EN EL TRATAMIENTO DE LA AMILOIDOSIS AL. EXPERIENCIA CONTEMPORÁNEA DE UN CENTRO

David Couto Mallón[1], Guillermo Debén Ariznavarreta[2], Daniel Enríquez Vázquez[1], Ana María Vale López[2], Gonzalo Barge Caballero[1], Jorge Pombo Otero[3], Paula Blanco Canosa[4], Eduardo Barge Caballero[1], María Jesús Paniagua Martín[1], Víctor X. Mosquera Rodríguez[5], Miguel Antonio Solla Buceta[6], José Joaquín Cuenca Castillo[5], José Manuel Vázquez Rodríguez[1] y Maria G. Crespo Leiro[1]

[1]Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. CIBERCV, A Coruña, España,[2]Hematología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España, [3]Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España, [4] Cardiología. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España,[5]Cirugía cardiaca. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. CIBERCV, A Coruña, España y [6]Medicina Intensiva. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España.

Resumen

Introducción y objetivos: El pronóstico de los pacientes con amiloidosis AL y afectación cardiaca es sombrío y en ocasiones es necesario considerar el trasplante cardiaco (TC) como parte del tratamiento de la enfermedad. Nuestro objetivo fue describir la experiencia contemporánea de pacientes con amiloidosis AL que reciben un TC en un centro español.

Métodos: Estudio retrospectivo de un centro en el que se incluyeron todos los trasplantados cardiacos mayores de 18 años entre enero de 2016 y diciembre de 2022. Los pacientes con amiloidosis AL (AL) se compararon con los pacientes sin amiloidosis AL (no-AL) mediante ?^{2}, test exacto de Fisher o Kruskal-Wallis. El seguimiento se realizó hasta el fallecimiento del paciente o, en su defecto, hasta el 15 de abril de 2023. La supervivencia de los pacientes se evaluó mediante Kaplan Meier.

Resultados: Durante el periodo del estudio se trasplantaron un total de 175 pacientes: 168 no-AL y 7 AL. El tiempo de seguimiento mediano fue de 39 meses (RIC 16,4-66,9 meses). Los pacientes AL tenían una FEVI significativamente mejor los no-AL (FEVI mediana 45 vs 25%, p = 0,003) y una tendencia no significativa a tener NT-proBNP más altos (NT-proBNP mediano 9.000 pg/ml vs 4.780 pg/ml, p = 0,137) y menor índice cardiaco (2,3 vs 2,5 L/min/m^2, p = 0,143) pero no presentaban diferencias estadísticamente significativas en otras características basales (tabla). El tiempo mediano entre el diagnóstico de amiloidosis AL y el TC fue de 215 días (RIC 65-468 días). 5 pacientes iniciaron la quimioterapia (QT) previamente al TC y 5 pacientes recibieron QT posteriormente al TC tras una mediana de tiempo de 33 días (18-38 días). Un paciente AL falleció en el postoperatorio debido a fracaso primario del injerto. 6 pacientes recibieron un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en el seguimiento. El tiempo mediano hasta el TPH después del TC fue de 212 días (RIC 179-291 días). En el análisis de Kaplan Meier la supervivencia a 3 meses, 12 meses y 5 años fue del 85,7% en los pacientes AL y del 88,6%, 85,7% y 81,5% respectivamente en los pacientes no-AL (p *log rank* = 0,808) (figura).

Tabla comparativa de pacientes AL y no-AL

	No amiloidosis AL (n = 168)	Amiloidosis AL (n = 7)	p
Edad (años)*	60,2 (53,2-65,4)	61,4 (59,6-62,4)	0,976
Sexo mujer, n (%)	38 (22,6%)	1 (14,3%)	0,512
IMC (Kg/m^2)*	25,06 (22,9-27,9)	22,8 (20,9-28,4)	0,272
TFG (ml/min/1,73 m^2)*	57,9 (45,4-71,1)	79,2 (50,5-90)	0,133
Albúmina (g/dl)*	3,9 (3,4-4,3)	4,1 (3,5-4,4)	0,647
Bilirrubina (mg/dl)*	0,8 (0,58-1,3)	0,9 (0,6-1,1)	0,948
NT-proBNP (pg/ml)*	4.178 (2.170-7.390)	9.000 (3.070-11.700)	0,137
FEVI (%)*	25 (20-32)	45 (31-56)	0,003
GTP (mmHg)*	7 (4-9)	5 (3-6)	0,178
IC (L/min/m^2)*	2,5 (2,1-3)	2,3 (1,6-2,7)	0,143
TC urgente, n (%)	85 (50,6%)	3 (42,9%)	0,494
Tiempo isquemia (min)*	153 (86-245)	238 (76-275)	0,430
FPI, n (%)	36 (21,4%)	1 (14,3%)	0,543
SCM post -TC, n (%)	21 (12,6%)	1 (14,3%)	0,619
HDFVVC post-TC, n (%)	35 (20,8%)	0	0,203
Rechazo 2R o mayor, n (%)	67 (39,9%)	2 (28,6%)	0,430
Infección CMV sintomática, n (%)	31 (18,5%)	2 (28,6%)	0,393

FEVI último seguimiento (%)*	60 (60-67)	60 (57,5-68)	0,332

CMV: citomegalovirus; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FPI: fracaso primario del injerto; GTP: gradiente transpulmonar; HDFVVC: hemodiafiltración veno-venosa continua; IC: índice cardiaco; IMC: índice de masa corporal; SCM: soporte circulatorio mecánico; TC: trasplante cardiaco; TFG: tasa de filtrado glomerular. *Se expresa en mediana y rango intercuartílico.

Conclusiones: La amiloidosis AL es una causa infrecuente de TC. En nuestra serie, los pacientes AL tuvieron una supervivencia comparable a los pacientes no-AL, aunque el número reducido de pacientes puede haber influido a la hora de encontrar diferencias significativas.