6124-3. ESTUDIO GENÉTICO EN POBLACIÓN ADULTA Y PEDIÁTRICA CON HIPERTENSIÓN PULMONAR

Julia Playán Escribano¹, Alejandro Cruz Utrilla², Alejandro Rodríguez Ogando³, Natalia Gallego Zazo⁴, Anna Sabaté Rotés⁵, Nuria Ochoa Parra², Jair Tenorio Castaño⁴, María Lozano Balseiro⁶, Carmen Pérez Olivares Delgado⁷, Erika Rezola Arcelus⁸, Pablo Lapunzina Abadía⁴, Beatriz Plata Izquierdo⁹, Amaya Martínez Meñaca¹⁰, M. Pilar Escribano Subias² y María Jesús del Cerro Marín¹¹

¹Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España, ²Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España, ³Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España, ⁴Hospital Universitario La Paz, Madrid, España, ⁵Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona, España, ⁶Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera, A Coruña (A Coruña), España, ⁷Hospital Universitario del Henares, Coslada (Madrid), España, ⁸Hospital Donostia, Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), España, ⁹Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España, ¹⁰Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria), España y ¹¹Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.

Resumen

Introducción y objetivos: Se han descrito distintas variantes patogénicas en la hipertensión arterial pulmonar (HAP). El objetivo fue describir las alteraciones genéticas en HAP idiopática (HAPI), hereditaria (HAPH), venooclusiva (EVOP) y HAP asociada a cardiopatías congénitas (HAP-CC); en población adulta y pediátrica.

Métodos: El REHAP y el REHIPED son registros voluntarios y multicéntricos que incluyen pacientes con HAP. El REHAP inició en 2007 e incluye a mayores de 18 años. El REHIPED inició en 2009 y recoge pacientes entre 2 meses y 18 años. Se incluyeron pacientes con HAPI, HAPH, EVOP y HAP-CC que se habían sometido a test genético: 413 adultos y 122 niños. Desde 2011, se emplearon técnicas de Sanger para los genes *BMPR2*, *TBX4* y *KCNK3*. Desde 2014, un panel de secuenciación masiva de 21 genes. En 2017 se amplió a 35 genes; y en 2017, a 37 genes. Desde 2020 se secuencia el exoma completo en todos los casos incidentes y en aquellos pacientes en seguimiento sin variantes patogénicas (P) o probablemente patogénicas (LP).

Resultados: La etiología fue significativamente distinta: en adultos fue de 242 (59%) HAPI, 25 (6%) HAPH, 83 (20%) HAP-CC y 63 (15%) EVOP. En niños fueron 66 (54%) HAPI, 8 (7%) HAPH, 38 (31%) HAP-CC y 10 (8%) EVOP. El test genético mostró una variante en 121 (29%) adultos (56% P, 9% LP, 32% significado incierto (VUS)) y en 63 (52%) niños (65% P, 16% LP, 19% VUS) (p 0,001). Las variantes en *BMPR2* fueron las más frecuentes, seguidas de *EIF2AK4*. Los pacientes con HAPH y EVOP son los que más frecuentemente presentan alteración genética, y los pacientes con HAP-CC, los que menos (p 0,001). La etiología se reclasificó después del test genético en el 13% de los adultos y el 19% de los niños (p 0,08), incluyendo 6 adultos y 4 niños inicialmente diagnosticados de HAPI y después reclasificados como EVOP. Además, 5 niños inicialmente diagnosticados de HAPI se reclasificaron como trastornos multisistémicos (4 NFU1 y 1 MECP2).

Variantes genéticas en las diferentes etiologías de la hipertensión pulmonar (según la sospecha inicial previa al test genético).

Conclusiones: En conclusión, un número significativo de pacientes con HAP presentan una alteración genética, especialmente los niños. Las variantes en *BMPR2* son las más frecuentes en nuestra cohorte, seguidas de aquellas en *EIF2AK4*. Conocer el genotipo de nuestros pacientes permite conocer mejor la fisiopatología y etiología de su enfermedad. Esto impacta en su tratamiento presente y puede ayudar a desarrollar nuevas dianas terapéuticas en el futuro.